

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Ginkofar

Ginkgo bilobae fol. extr. sicc.

40 mg

Tabletki powlekane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Ginkofar ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasila się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ginkofar i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar
3. Jak stosować lek Ginkofar
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ginkofar
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GINKOFAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ginkofar zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Zawarty w nim zespół substancji czynnych zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie.

Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznym i adrenergicznym α_2 , poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrażenia tkankowego krwi.

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki oraz działa neuroprotekcyjnie.

Kliniczne działanie leku Ginkofar polega na:

- zmniejszeniu niedokrwienia mózgu,
- usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych,
- ochronie komórek przed niedotlenieniem,
- hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi.

Wskazania do stosowania leku Ginkofar

Lek Ginkofar stosuje się w zaburzeniach:

- krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach, osłabienie słuchu i wzroku,
- krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych – uczucie zimna i bólu w stopach.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GINKOFAR

Kiedy nie stosować leku Ginkofar

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku i złą tolerancję leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ginkofar

Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności.

Stosowanie leku Ginkofar z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie są znane niekorzystne działania wyciągu z miłorzębu japońskiego na płód i noworodka.

Z przyczyn ogólnolekarskich leku Ginkofar nie należy stosować w czasie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Ginkofar nie wywiera ujemnego wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ginkofar

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GINKOFAR

Lek Ginkofar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ginkofar przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

W zaburzeniach krążenia:

- mózgowego: stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 2 tabletki.
- obwodowego: stosuje się 2 razy na dobę po 2 tabletki.

Terapia zasadnicza powinna trwać 8 - 12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po około 4 tygodniach leczenia. Po kuracji zasadniczej, wskazane jest dalsze przyjmowanie leku 1 do 2 razy dziennie po 1 tabletkę.

Ginkofar jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez długi czas.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku

Po przedawkowaniu jednorazowym lub wielokrotnym mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, gonićwa myśli oraz bóle głowy.

Pominięcie zażycia leku Ginkofar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ginkofar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko pojawiać się mogą dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić bóle głowy lub wysypki skórne o charakterze alergicznym.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GINKOFAR

Lek Ginkofar należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Ginkofar po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ginkofar

Substancją czynną leku jest: 40 mg suchego ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego *Ginkgo biloba* L. (35-67:1), standaryzowanego na zawartość od 22% do 27% ginkgoflawonoglikozydów i od 5% do 7% laktonów terpenowych w tym 2,8% do 3,4% ginkgolidów A, B, i C, oraz 2,6% do 3,2% bilobalidu i nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych; ekstrahent: aceton 60% m/m.

Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian, bezwodna krzemionka koloidalna, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty.

Jak wygląda lek Ginkofar i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, okrągłe, gładkie, koloru beżowo - żółtego, bez wykruszeń, z dopuszczalnymi plamkami innego koloru.

Dostępne opakowania: pudełko tekturowe zawierające 20, 60 i 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań,

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Tel. 061 66 51 500

Data zatwierdzenia ulotki: 08.12.2008