Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

Vomitusheel compositum

czopki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:
1 czopek 1,1 g zawiera:
Substancje czynne: Cephaelis ipecacuanha D4 0,605 mg, Aethusa cynapium D4 0,605 mg, Strychnos nux-vomica D5 0,605 mg, Apomorphinum hydrochloricum D4 0,9075 mg, Colchicum autumnale D4 1,5125 mg.

Substancje pomocnicze: tłuszcz obojętny

Zawartość leku w opakowaniu: 12 czopków

Podmiot odpowiedzialny:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg- Str 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vomitusheel compositum i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vomitusheel compositum
3. Jak stosować lek Vomitusheel compositum
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vomitusheel compositum
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Vomitusheel compositum

1.Co to jest lek Vomitusheel compositum i w jakim celu się go stosuje

Vomitusheel compositum czopki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w nudnościach.

2.Zanim zastosuje się lek Vomitusheel compositum

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Stosowanie leku Vomitusheel compositum u dzieci:
Ze względu na brak wystarczająco udokumentowanych danych klinicznych, nie zaleca się podawania produktu dzieciom poniżej 6 roku życia bez konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3.Jak stosować lek Vomitusheel compositum

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza:

Dzieci od 6 do 12 roku życia:
zwykle po 1/2 czopka 2-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
zwykle po 1 czopku 2-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza.

Nie przekraczać zaleconej dawki.
Dawkę należy zmniejszyć po uzyskaniu poprawy.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vomitusheel compositum niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Vomitusheel compositum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vomitusheel compositum czopki może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5.Przechowywanie leku Vomitusheel compositum

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, nawet przez krótki czas, ponieważ może to spowodować zmiękczenie i rozpuszczenie masy czopka.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
tel. 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *01.2011*

Kod opakowania: