

Instrukcja stosowania - należy przeczytać uważnie

---

# Dermaveel

---

Należy uważnie przeczytać tę informację przed zastosowaniem kremu Dermaveel. **Nie należy wyrzucać ulotki!** Zawiera ona ważne informacje. W przypadku wątpliwości dotyczących produktu Dermaveel należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub firmą Heel Polska Sp. z o.o.

## 1. Co to jest Dermaveel i w jakim celu się go stosuje

Dermaveel jest wyrobem medycznym stosowanym w leczeniu wspomagającym atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz innych dermatoz o niewiadomej etiologii, w przebiegu których występuje sucha skóra, zaczerwienienie i świąd skóry.

- Dermaveel leczy objawy najczęściej stwierdzane u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry:
  - świąd
  - zaczerwienienie skóry
  - suchość skóry
- Dermaveel zawiera unikalną kombinację składników o działaniu przeciwświądowym, zmniejszającym stan zapalny oraz nawilżającym.
- Dermaveel zmniejszając stan zapalny i wspomagając procesy regeneracyjne łagodzi podrażnienia i uszkodzenia skóry.
- Dermaveel pomaga odbudować powierzchniową warstwę skóry, stabilizuje błony komórkowe zwiększając w ten sposób odporność skóry na czynniki zewnętrzne.
- Substancje zawarte w kremie Dermaveel pozwalają przywrócić prawidłową funkcję bariery skórnej, prowadząc do odbudowy i ochrony skóry.
- Dzięki właściwościom ochronnym i stabilizującym barierę skórną Dermaveel może być stosowany w celu zapobiegania zaostrzeniom choroby.
- Najważniejszymi składnikami kremu Dermaveel są substancje pochodzenia naturalnego: ektoina, krem lamellarny i wyciąg z kory leszczyny.
- Dermaveel dzięki zawartym w nim substancjom pochodzenia naturalnego, łagodzi podrażnienia, nawilża i chroni skórę. Składniki te zostały tak dobrane, aby redukować objawy i zaspokajać zróżnicowane potrzeby atopowej skóry.
- Dermaveel nie zawiera sterydów.
- Dermaveel jest dobrze tolerowany i może być stosowany tak długo jak potrzeba.

- Dermaveel nie zawiera barwników, substancji zapachowych ani konserwantów.
- Dermaveel nie zawiera parabenów i olejów mineralnych.

## **2. Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Nie należy stosować kremu Dermaveel w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na ektoinę lub jakiegokolwiek inny składnik kremu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania kremu Dermaveel .
- Dermaveel nie powinien być stosowany na zainfekowaną skórę.
- W celu zachowania higieny dane opakowanie powinno być stosowane wyłącznie przez jedną osobę.
- Wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę.
- Zawiera 3,7 % alkoholu.

## **3. Informacje ważne przed zastosowaniem kremu Dermaveel**

Interakcje pomiędzy kremem Dermaveel a innymi kremami nie są znane. Należy zachować odstęp co najmniej 2 godzin pomiędzy zastosowaniem kremu Dermaveel a innymi stosowanymi zewnętrznymi wyrobami medycznymi, produktami leczniczymi, kremami lub produktami przeciwśłonecznymi.

## **4. Co należy wziąć pod uwagę w czasie ciąży lub karmienia piersią**

Obecnie brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania kremu Dermaveel w czasie ciąży i karmienia piersią.

Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem kremu Dermaveel w następujących przypadkach:

- ciąża lub okres karmienia piersią
- podejrzenie ciąży

## **5. Jak stosować Dermaveel**

Dermaveel należy stosować zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją stosowania. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem kremu. Dermaveel powinien być stosowany dwa razy dziennie lub tak często, jak to jest konieczne, jeśli lekarz nie zaleci inaczej.

Krem należy delikatnie wmasować w uszkodzoną, zmienioną chorobowo skórę, aż zostanie on całkowicie wchłonięty. Jeśli Dermaveel jest dobrze tolerowany, może być stosowany długotrwale.

Jeśli w czasie stosowania kremu stan skóry ulegnie pogorszeniu lub jeśli nie nastąpi poprawa nawet po długotrwałym stosowaniu, należy zaprzestać jego stosowania i zasięgnąć porady lekarza

## **6. Możliwe działania niepożądane kremu Dermaveel**

Dermaveel jest dobrze tolerowany. Nie stwierdzono dotychczas regularnie występujących lub utrzymujących się działań niepożądanych. W pojedynczych przypadkach obserwowano wystąpienie miejscowego, krótkotrwałego uczucia pieczenia. W przypadku zaobserwowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kremu Dermaveel należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub firmą Heel Polska. Jeśli stan zapalny skóry będzie się utrzymywał lub ulegnie pogorszeniu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

## **7. Jak przechowywać Dermaveel**

Termin ważności Dermaveel znajduje się na kartoniku oraz na opakowaniu bezpośrednim produktu. Nie wolno stosować kremu Dermaveel po upływie terminu ważności. Po otwarciu tuby nie należy stosować kremu dłużej niż 3 miesiące.

Dermaveel powinien być przechowywany w temperaturze od 2 °C do 25 °C.

Dermaveel powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## **8. Zawartość opakowania kremu Dermaveel i inne informacje**

Tuba aluminiowa zawierająca 5 ml, 15 ml lub 30 ml kremu.

**Składniki:** ektoina, woda, gliceryna, glikol pentylenowy, pantenol, glikol kaprylowy, hydroksyetyloceluloza, trigliceryd kaprylowy/kaprynowy, olej z nasion Simmondsia chinensis, skwalan, tokoferol, olej z owoców Olea europaea, uwodorniony olej roślinny, masło z Butyro- spermum parkii, wyciąg z owoców Vanilla planifolia, alkohol denat. karbomer, karbomer sodowy, guma z Rhizobium, wyciąg z kory Corylus avellana, uwodorniona lecytyna, alkohole C12-16, kwas palmitynowy, ceramid 3.

## **9. Podmiot Odpowiedzialny/Wytwórca**

bitop AG Stockumer Str. 28

58453 Witten, Niemcy

## **Dystrybutor**

Heel Polska

ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 545 07 15

## **10. Data sporządzenia informacji**

Kwiecień 2014